

Endoscopie à capsule - petit intestin

Chères patientes/chers patients,

Il faut des conditions de visibilité optimales dans l'intestin. Veuillez donc au respect minutieux du schéma de préparation qui suit :

LAXATIF :

- Vous pouvez vous procurer le laxatif servant à la préparation de l'intestin à la pharmacie. Il vous sera remis sur présentation de l'ordonnance ci-jointe (Moviprep®).

PREPARATION :

À la veille de l'examen :

- **17h00** : La nourriture solide est interdite à partir de cette heure jusqu'à la fin de l'examen. Vous pouvez consommer de l'eau jusqu'à 22h00.
- **18h00** : Versez 1 litre d'eau dans un récipient. Ajoutez le contenu d'un sachet A et d'un sachet B du MOVIPREP. Mélangez jusqu'à ce que le liquide soit presque clair. Mettez le liquide au froid. Buvez le mélange dans une heure, un verre toutes les 5 à 10 minutes. Nous vous conseillons vivement de boire au moins un demi-litre d'eau pour éviter la soif extrême et la déshydratation du corps par la suite. Veillez à ce qu'une toilette libre se trouve à proximité car le médicament provoque des diarrhées.
- **22h00** : les boissons sont interdites à partir de cette heure sauf en cas de prise des médicaments nécessaires (une gorgée).

Au jour de l'examen :

- **20 min. avant l'examen** : Appliquez 15 pulvérisations de Flatulex (sur place au cabinet).
- **Veillez à porter des vêtements amples qui ne serrent pas. N'employez aucune lotion corporelle.**

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Adressez-vous directement au cabinet si vous avez d'autres questions au sujet de l'examen.

D'ores et déjà nous vous souhaitons la bienvenue.

Votre équipe GGP