

Merkblatt zur pH-Metrie-Impedanz-Messung in der Speiseröhre

Bei Ihnen wird eine Abklärung von Reflux (Messung von Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre und den Mund) durchgeführt. **Die pH-Metrie-Impedanz-Messung** erfolgt mit einem 3 mm schmalen Katheter, der durch die Nase eingelegt wird. Diese Messung wird ambulant durchgeführt und dauert insgesamt 24 Stunden. Ein Fremdkörpergefühl im Hals (leichter Druck oder beginnende Halsschmerzen wie bei einer Grippe) ist in den ersten Stunden der Messung normal. Die Messung ist nicht gefährlich, aber wenn Sie Angst haben kann die Sonde ganz einfach jederzeit von Ihnen selber entfernt werden. Die Sonde ist von aussen sichtbar, weshalb Kundenkontakt im Beruf an diesem Tag nicht empfehlenswert ist. Wichtig ist, dass während der Messung ein möglichst normaler Tagesablauf eingehalten wird (Essen, Liegen etc.). Nach 24 Stunden wird die Sonde entfernt und die Auswertung wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Sprechstunde mit Ihnen besprochen.

Vorbereitung: Normalerweise werden Säureblocker (Nexium, Pantoprazol, Esomep, Esomeprazol etc.) 10 Tage vor der Untersuchung nicht mehr eingenommen, da diese die Messung verfälschen. Sie sollten nüchtern, d.h. ohne Essen und Trinken in den letzten 6 Stunden, zur Untersuchung erscheinen. Am Tag der Säuremessung benötigen Sie eventuell ein Arztzeugnis zur Befreiung von Ihrer Arbeit.

Haben Sie Fragen?

Für weitere Fragen bezüglich der Untersuchung wenden Sie sich am besten direkt an unsere Praxis (Tel 031 312 3737).

Bitte bringen Sie Ihre Krankenkassenkarte mit.

Besten Dank für die gewissenhafte Vorbereitung.

Wir freuen uns auf Sie. Ihr GGP-Team